

♦ טיפול בהליקובקטר פילורי, קו ראשון

○ **רופא יקר לפניך מס' אופציות לטיפול בזיהום על ידי החיידק הליקובקטר פילורי על פי** ההנחיות האחרונות משנת 2022 (Maastricht VI/Florence consensus report). קו ראשון לטיפול ב-H pylori הינו כולל 3 אנטיביוטיות שונות ותרופה מיועדת לנטרול תפוקת חומצית בקיבה (קבוצת PPI), במינון גבוה מן הרגיל: 40 מ"ג פעמיים ביום. **כל התרופות כדלקמן, יש ליטול למשך 14 ימים.**

• אופציה א': (אינה כוללת קלבטון)

תרופה	ערב	בוקר
Nexium 40 MG:	כדור אחד	כדור אחד
Amoxicillin 500 MG:	2 כדורים	2 כדורים
Metronidazole 250 MG:	2 כדורים	2 כדורים
Clarithromycin 500 MG:	כדור אחד	כדור אחד

• אופציה ב': (כוללת קלבטון)

תרופה	ערב	בוקר
Nexium 40 MG:	כדור אחד	כדור אחד
Metronidazole 250 MG:	2 כדורים <u>שלוש</u> פעמים מידי יום	
Kalbeten Forte 524 MG:	כדור אחד ארבע פעמים מידי יום	
Doxycyclin 100 MG:	כדור אחד	כדור אחד

הערות:

- 1- אין להפסיק הטיפול טרם השלמתו למשך 14 ימים, אחרת הסיכוי או שיעור למיגור הזיהום הולך וקטן.
- 2- ניתן להשתמש בכל PPI אחר, אך **במינון הינו כפול מן הרגיל ופעמיים מידי יום**
- 3- ניתן להשתמש ב-Tinidazole 500 מ"ג במקום Metronidazole במינון 500 מ"ג פעמיים מידי יום
- 4- ניתן להשתמש ב-Tetracycline במקום Doxycycline אך המינון הינו שונה: Tetracycline 500 מ"ג (ארבע פעמים מידי יום)
- 5- במידה ותתקשה/י ליטול **קלבטון פורטה** כדור אחד ארבע פעמים מידי יום, **ניתן** ליטול שני כדורים פעמיים מידי יום
- 6- משך הטיפול לעיל הינו **14 יום**, ללא קשר לאופציה הנבחרת.
- 7- במידה וקיימת אי ספיקת כליות יש להיוועץ ברופא נפרולוג לגבי המינונים טרם תחילת הטיפול לעיל
- 8- במידה וישנה רגישות יתרה לפניצילין-Penicillin, יש לבחור באופציה ב' או לסירוגין להיוועץ ברופא מומחה באלרגיה.

ד"ר דלגדו חורחה-שמואל
MD, AGAF, FAASLD
 מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
 בית החולים אסותא "כלנית" אשדוד

9- יש לוודא את מיגורו של החיידק כחודש לאחר תום הטיפול לעיל על ידי בדיקת נשיפה לזיהוי HP.

♦ טיפול בהליקובקטר פילורי, קוון שני

○ רופא יקר, לפניך מס' אופציות לטיפול בזיהום על ידי הליקובקטר פילורי, למטופלים שנכשלו בטיפול הקודם למיגורו:

• אופציה ראשונה: (במידה ולא קיבלו טיפול ראשוני מבוסס על קלבטון)

תרופה	ערב	בוקר
Nexium 40 MG:	כדור אחד	כדור אחד
Metronidazole 250 MG:	2 כדורים שלוש פעמים מידי יום	
Kalbeten Forte 524 MG:	כדור אחד ארבע פעמים מידי יום	
Doxycyclin 100 MG:	כדור אחד	כדור אחד

• אופציות שנייה ושלישית: (מבוססות על טיפול ב-Levofloxacin עם או בלי קלבטון)

תרופה	ערב	בוקר
Nexium 40 MG:	כדור אחד	כדור אחד
Levofloxacin 500 MG:	כדור אחד בלבד מידי יום	
Amoxycillin 500 MG:	2 כדורים	2 כדורים

תרופה	ערב	בוקר
Nexium 40 MG:	כדור אחד	כדור אחד
Levofloxacin 500 MG:	כדור אחד בלבד מידי יום	
Kalbeten Forte 524 MG:	כדור אחד ארבע פעמים מידי יום	
Amoxycillin 500 MG:	2 כדורים	2 כדורים

הערות:

- 1- משך הטיפול לעיל **הינו 14 יום**, ללא קשר לאופציה הנבחרת
- 2- במידה וקיימת אי ספיקת כליות יש להיוועץ ברופא נפרולוג לגבי המינונים טרם תחילת הטיפול לעיל

ד"ר דלגדו חורחה-שמואל
MD, AGAF, FAASLD
 מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
 בית החולים אסותא "כלנית" אשדוד

- 3- **יש לוודא את מיגורו** של החיידק על ידי תבחין נשיפה לזיהוי HP כחודש לאחר תום הטיפול.
- 4- במידה וישנה רגישות יתרה לפניצילין-Penicillin, **יש לבחור באופציה ב' או לסירוגין** להיוועץ ברופא מומחה באלרגיה.

♦ טיפולי מיוחדים במקרים שכל האופציות לעיל נכשלו לחלוטין

• אופציה ראשונה, למשך 14 ימים

תרופה	
Nexium 20 MG:	כדור אחד ארבע פעמים מידי יום
Amoxycillin 750 MG:	כדור אחד ארבע פעמים מידי יום


• אופציות שנייה ושלישית, באישור מיוחד ולמשך 10 ימים בלבד

תרופה	ערב	בוקר
Nexium 40 MG:	כדור אחד	כדור אחד
Rifabutin 300 MG:	כדור אחד בלבד מידי יום	
Amoxycillin 500 MG:	2 כדורים	2 כדורים

תרופה	ערב	בוקר
Nexium 40 MG:	כדור אחד	כדור אחד
Rifabutin 300 MG:	כדור אחד בלבד מידי יום	
Clarithromycin 500 MG:	כדור אחד	כדור אחד

○ **לבסוף**, ניתן לעבור בדיקת גסטרוסקופיה, לצורך לקיחת ביופסיות מן הקיבה על מנת לקבוע דרגות רגישות \ עמידות אנטיביוטית: Antimicrobial susceptibility testing

○ **אנו מקווים שמידע לעיל יקל עליך במהלך הטיפול בהליקובקטר פילורי**



מוקד זימון תורים: 0508505385